

Cet insecte, encore rare dans les collections, m'a été cédé par M. Deyrolle qui n'en possédait qu'un seul individu provenant de la province de S-te Cathérine au Brésil. J'en ai vu un second dans la riche collection de M. I. Thomson, qui a bien voulu me le dédier.

Distipsidera.

Westwood Mag. of Zool. and Bot. I. p. 251.

(Conf. Lacordaire Gen. 1. p. 24.).

Palpi labiales basi inflati.

Mentum dente medio vix conspicuo.

Labrum fornicatum, porrectum, antice angustatum, lateribus acute bidentatum, utrinque non sulcatum, in utroque sexu antice tridentatum, dentibus porrectis, intermedio in mare obtuso brevique, in foemina caeteris aequali.

Tarsi supra non sulcati, setigeri.

Habitus elongatus, parallelus, oculis valde prominulis.

Je ne connais que deux espèces qui fassent partie de ce genre, savoir: 1) *D. undulata* Westwood l. c. qui habite la côte sud-ouest de l'Australie, et 2) *D. flavicans* (Megalomma) Chaudoir Bull. Mosc. 1854. I. p. 14. de Moreton bay. A l'époque où je décrivais cette espèce, je réunissais encore les deux genres que je distingue maintenant à cause de la présence dans l'un, et de l'absence dans l'autre des sillons tarsaux.

Caledonica.

Palpi labiales basi inflati.

Mentum dente medio acuto, porrecto, tenui.

Labrum fornicatum, porrectum, antice angustatum, lateribus anterieus unidentatum, utrinque sulcatum, margine antico maris submarginato-truncato, foeminae subrotundato, acute tridentato.

Tarsi supra non sulcati, setigeri.

Habitus fere praecedentis.

Les trois espèces connues de ce nouveau genre habitant toutes la Nouvelle-Calédonie, je lui ai donné le nom du pays auquel cette forme est propre.

C. Mnischevi (Distipsidera) Thomson, dans Guérin, Rev. et Mag. de Zool. 1856. p. 112. N° 1. pl. 5. f. 1.

C. fasciata. Long. 13 mill. Mâle. Viridi-olivacea, capite irregulariter striato-rugoso, inter oculos arcuatim transverse impresso, antice subtuberculato, oculis magnis valde prominulis; thorace capite cum oculis paulo angustiore, transverso, brevi, basi apiceque brevissime constricto, medio lateribus valde rotundatis non vero spinosis; supra convexo, pulvinate, transverse rugoso, tenuiter marginato, lineis transversis juxta utrumque apicem sinuatis, profundis, longitudinali media obsoleta; elytris capite cum oculis latioribus, anterieus subdilatis, humeris quadratis, apice rotundatis, lateribus subrectis, apice subtruncato-rotundato, serrato, sutura subdentata, supra basi convexis, dein sensim planioribus, ad latera non vero ad apicem declivibus, fortius minus dense punctato-rugosis, bicostatis, costis basi longius apiceque abbreviatis, externa subarcuata, seriepunctatis, sublaevibus, spatio inter costas suturamque obsoletius punctato, macula majuscula brevi, quadrata humerali, fascia ante medium angusta, marginem versus paulo latiore, intus abbreviata, fere recte, nec obliqua, alteraque longe ante

apicem sita, latiore, magis a sutura remota, maculam transversam, fere quadratam simulante, albis, obsoletius punctatis, epipleuris basi longius albidis. Subtus viridicyanea, cuprescens, omnino laevis, metasterni margine postico, coxis omnibus pedibusque pallide luteis, tarsis articulo singulo apice infuscato; palpis luteis, tabialium articulo penultimo inflato pallidiore; antennis fuscis, medio dilutioribus, articulo basali pallido supra nigromaculato, secundo obscuro, tertio et quarto supra nigrolineatis, apicalibus duobus nigris; ore, labro mandibulisque pallide luteis, his apice nigris. In mare articulis tarsorum dilatatis, subtus nigropilosis.

M. Guérin-Ménéville m'a cédé l'individu unique qu'il possédait, mais je l'ai vu dans plusieurs collections parisiennes.

C. lunigera. Long. 11 mill. Mâle. Praecedenti valde assimilis, differt imprimis signatura elytrorum. Caput et thorax ut in illa, hic tamen angustior, elytra multo minus elongata, apice singulatim subrotundata, sutura vix dentata, supra costis laevibus distinctioribus, spatio intermedio apiceque obsoletius punctatis, macula humerali elongata, lunata, fascia media latiore, multo brevior, subobliqua, maculam subquadratam simulante, ante apicem macula minore ovata, subtransversa.

Je l'ai achetée à Londres chez M. S. Stevens. Cette espèce vient peut-être des Nouvelles-Hébrides.

Ophryodera.

(ἔσρος, rebord, δέση, col.).

Palpi labiales haud inflati.

Mentum medio dentatum.

Labrum fornicatum, amplum, rotundatum, quinquedentatum.

Tarsi supra sulcati, antici articulis tribus primis in mare dilatatis, supra simplicibus.

Thorax latere acute reflexo.

Habitus Calochroae Hope.

Ce genre a été établi sur la belle *Cicindela rufo-marginata* (Melly) Boheman, Ins. Caffr. I. p. 3. № 5, remarquable par les côtés du corselet relevés en carène, ce qui est aussi le cas, mais à un moindre degré, dans le genre suivant.

Bostrichophorus.

Thomson, Ann. de la Soc. Ent. de France. 1856. p. 331.

Palpi labiales non inflati.

Mentum medio longe dentatum, lobis angustis.

Labrum fornicatum, amplum, rotundatum, quinquedentatum.

Antennae medio valde dilatatae, foliaceae.

Tarsi supra sulcati.

Habitus Calochroae angustae.

Ce nouveau genre a été créé par M. I. Thomson sur une espèce de Mozambique que M. Bertoloni a envoyée à ses correspondants sous le nom d'*Euprosopus Bianconi*, mais il s'est borné à exposer d'une manière insuf-

MATÉRIAUX

pour servir à l'étude

DES CICINDÉLÈTES ET DES CARABIQUES.

PAR

le Baron de Chaudoir.

1-^e PARTIE.

CICINDÉLÈTES.

Latreille Gen. Crust. et Ins. I. p. 172.

Ligula brevissima, sub mento recondita.

Palpi labiales stipite libero.

Antennae fronti supra mandibularum basin insertae.

Je n'ai fait mention ici que des seuls caractères qui distinguent cette famille de celle des Carabiques. Quant à ceux qui la distinguent des autres familles des Coléoptères, ils sont assez connus, et je renvoie le lecteur à la définition donnée par M. Schaum (Naturgesch. der Ins. I. p. 1.).

N^o 1. 1860.

18

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Марта 21-го, 1861 года.

Цензоръ Я. Прибыли

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

TOME XXXIII.

ANNÉE 1860.

N°. IV.

MOSCOU.

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.
1860.