

jaune du milieu ; la partie postérieure, derrière la bande, est entièrement couverte de gros points enfoncés qui vont à peine en s'affaiblissant jusqu'à l'extrémité. La coloration est la même que dans les individus typiques du *trinotatum*, c'est-à-dire qu'il y a aussi sur les élytres une tache sub-humérale, une bande transversale placée au delà du milieu, mais plus étroite ; l'extrémité est plus largement colorée en jaune. M. de Gautard, de Vevey, à qui je suis redevable de cette espèce, l'a reçue des environs de Caravellas, dans la prov. de Porto Seguro.

*Caledonica acentra*. Long., 15 m. 2 mâles. De la taille de *l'affinis*, quelquefois plus grande. Plus voisine de la *Mniszechii*, plus petite, avec les mêmes taches sur les élytres. Labre un peu moins long, coupé plus carrément à son extrémité, bordé de brun sur les côtés ; premiers articles des antennes plus clairs. Corselet dépourvu de la dent saillante qu'on voit sur le milieu des côtés de la *Mniszechii*, simplement anguleux ou même arrondi à cet endroit. Elytres exactement de la même forme, les deux côtes élevées plus lisses, presque droites et parallèles, nullement réunies vers le milieu par la petite arête oblique qu'on voit en cet endroit dans la *Mniszechii* ; l'espace entre les deux côtes presque lisse sur toute son étendue, ainsi qu'une bande longitudinale en dehors de la carène extérieure entre les deux taches postérieures ; tache humérale un peu plus allongée, plus dilatée inférieurement. Dessous du corps d'un vert cuivreux assez clair ; anus ferrugineux ; pattes presque entièrement d'un jaune ferrugineux ; cuisses à peine bronzées en dessus ; vestiture des tarses en dessous, noire comme dans le *Mniszechii*. Elle fait le passage de celle-ci à la *lunigera*, mais je la crois distincte des deux ; la sculpture des élytres et les taches sont à peu près comme chez celle-ci, mais le corselet est très-différent.

*Odontochila lucidicollis*. Long., 10 m. 1/2. Voisine de *l'Heteromalla*, dont elle diffère surtout par son corselet plus