

SPECIES

GÉNÉRAL

DES

COLÉOPTÈRES,

DE LA COLLECTION

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT

DE M^{LE} COMTE DE JEAN,

PAIR DE FRANCE, LIEUTENANT-GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROI, COMMANDEUR
DE L'ORDRE ROYAL DE LA LÉGION-D'HONNEUR, CHEVALIER DE L'ORDRE
ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-LOUIS, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ PHILO-
MATIQUE ET DE PLUSIEURS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET
ÉTRANGÈRES.

Tomé Second.

A PARIS,

CHEZ CREVOT, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, N^o 3,

PRÈS CELLE DE LA HARPE.

1826.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $2 \frac{1}{4}$ lignes.

Il ressemble beaucoup au *Bimaculatus* ; mais il en diffère par la tête qui est d'un vert-bronzé-obscur, un peu moins allongée et plus fortement ponctuée ; par les antennes dont les derniers articles sont un peu plus obscurs ; et surtout par le corselet qui est de la couleur des élytres , beaucoup plus court , plus arrondi et entièrement couvert de gros points enfoncés très-serrés. Les trochanters sont de la couleur des cuisses. Les élytres, le dessous du corps et les pattes sont presque entièrement comme dans le *Bimaculatus*.

Il faisait aussi partie de la collection de Java que j'ai achetée à Marseille.

5. C. BISIGNATUS. *Mihi.*

Capite thoraceque æneo-virescentibus ; thorace subrotundato , punctato ; elytris nigro-obscuro-subæneis ; lunula postica pedibusque flavis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup aux deux espèces précédentes ; mais il est un peu plus petit. La tête est d'une couleur bronzée un peu verdâtre ; elle est légèrement ponctuée , et elle a des rides irrégulières très-peu marquées qui se confondent avec les points. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un jaune un peu ferrugineux. Les quatre premiers articles des antennes sont de la même couleur, les autres brunâtres et légèrement pubescents. Le corselet est de la couleur de la tête, presque le double plus large qu'elle, beaucoup moins long que large et très-arrondi sur les côtés ; il est assez fortement ponctué ; mais les points sont cependant moins serrés et moins marqués que dans l'espèce précédente ; la ligne longitudinale du milieu est très-peu marquée, et il a de chaque côté de la base une impression longitudinale assez marquée ; le bord antérieur est très-légèrement

échancré; les bords latéraux sont légèrement rebordés; angles postérieurs sont très-arrondis, et la base est très-légèrement sinuée. L'écusson est de la couleur du corselet, triangulaire et presque lisse. Les élytres sont un peu plus courtes que celles des deux espèces précédentes; elles sont d'un noir-obscur très-légèrement bronzé; les stries sont un peu moins marquées, très-légèrement ponctuées, et les intervalles sont un peu moins fortement ponctués; elles ont chacune une tache jaune placée à peu près de la même manière, mais plus petite, en croissant dont les pointes sont tournées vers l'extrémité et qui occupe l'espace compris entre les troisième et septième stries. Le dessous du corps est d'un noir-obscur. Les pattes sont entièrement d'un jaune-ferrugineux.

Il m'a été envoyé par M. Roger comme venant de l'Ile-France.

SECONDE DIVISION.

6. C. CHALCOTHORAX.

Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis; thorace punctis sparse impressis; elytris nigro-æneis, pubescentibus, tenue striatis interstitiis subtilissime granulatis; margine, antennis pedibus flavo-ferrugineis.

WIEDEMANN. *Zoologisches Magazin*. II. I. p. 51. n° 73.
C. *Cinctus*. DEJ. *cat.* p. 8.

Long. $7 \frac{1}{2}$, 8 lignes. Larg. $3, 3 \frac{1}{4}$ lignes.

Il est un peu plus grand et un peu plus allongé que le *V. tinus*. La tête est un peu plus étroite; elle est d'un vert-brun brillant, lisse, et elle a des points enfoncés bien marqués, mais assez éloignés les uns des autres, à sa partie supérieure et sur ses côtés. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes s'