

du corps et le bord inférieur des élytres sont d'un brun rougeâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; je le dois à l'amitié de M. Leconte.

56. H. NIGRIPENNIS. *Mihi.*

Oblongus; capite thoraceque rufis; thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque punctato, foveolato, angulis posticis rectis; elytris nigris, striatis, postice oblique subsinuatis; antennis pedibusque testaceis.

Long. 4 $\frac{1}{4}$ lignes. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ ligne.

Il est un peu plus petit que le *Dichrous*, et il lui ressemble beaucoup à la première vue. Sa couleur est en-dessus d'un rouge ferrugineux sur la tête et le corselet, et d'un noir assez brillant sur les élytres. La tête est presque triangulaire, à peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression presque arrondie, assez fortement marquée. La lèvre supérieure est de la couleur de la tête. Les mandibules sont aussi à peu près de la couleur de la tête, et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, un peu moins long que large, presque carré, rétréci postérieurement, très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés et peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, assez marquée et ne dépasse guère les impressions transversales; l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure est un peu sinuée, et toutes les deux sont assez marquées; il a de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large et assez fortement marquée; le fond, les bords de cette impression et la partie de la base comprise entre elle et l'angle postérieur sont couverts de points enfoncés bien distincts et

assez serrés; quelquefois il y en a aussi quelques-uns au milieu de la base; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. L'écusson est noirâtre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés et presque planes; il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième; on voit seulement un point enfoncé assez distinct sur l'extrémité de la septième strie, une rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués le long du bord extérieur, près de la huitième strie, et vers l'extrémité quelques autres points qui se confondent avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et le bord inférieur des élytres sont d'un brun rougeâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été envoyé par M. Leconte.

57. H. SUBCOSTATUS. *Mihi.*

Oblongo-ovatus, niger; thorace subquadrato, postice utrinque obsolete foveolato, angulis posticis subrotundatis; elytris striatis, postice oblique profunde sinuatis, interstitiis alternatim subelevatis, tertio punctis impresso, linea dispositis.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble un peu, par la forme et la grandeur, à l'*Anisodactylus Binotatus*, et sa couleur est comme celle de cet insecte d'un noir assez brillant en-dessus. La tête est assez grande, presque arrondie, un peu rétrécie postérieurement, lisse, très-légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun presque noir. Les mandibules sont

plus arquées et moins avancées que dans les autres espèces de ce genre. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre. Les antennes sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez grands et peu saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que large, presque carré, arrondi sur les côtés et peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées et quelques stries longitudinales vers le bord antérieur, les unes et les autres à peine distinctes; la ligne longitudinale est fine et peu marquée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large, presque arrondie et peu marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés et un peu déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont obtus et presque arrondis; la base est un peu échancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, très-fortement sinuées et presque échancrées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez marquées; les premier, troisième, cinquième et septième intervalles sont un peu relevés; les autres sont planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, une rangée de sept à huit points enfoncés assez gros et assez marqués; on voit en outre un point enfoncé assez distinct sur l'extrémité de la septième strie, et une seconde rangée de points enfoncés plus nombreux et par conséquent plus rapprochés les uns des autres, le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce genre; j'en possède deux individus femelles qui m'ont été envoyés par M. Westermann, comme venant des Indes orientales.

58. H. EMARGINATUS. *Miki.*

Oblongus, niger; thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque subfoveolato, angulis posticis obtusis; elytris striatis, postice oblique profunde sinuatis, striis obsolete punctatis, interstitio tertio puncto impresso; labro, antennis pedibusque rufo-brunneis.

Long. 5 lignes. Larg. $1\frac{1}{4}$ ligne.

Il est un peu plus grand que l'*Eneus*, proportionnellement un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est assez grande, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression assez grande, presque arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre. Les yeux sont assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que large, presque carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés, peu convexe et presque plane; il a quelques rides transversales ondulées, et vers le bord antérieur quelques petites stries longitudinales, les unes et les autres à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure forme presque un angle sur la ligne du milieu, sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large et peu marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; les angles postérieurs sont obtus et légèrement arrondis; la base est coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, presque planes, très-fortement sinuées et presque