

**DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE
DU GENRE CALEDONICA CHAUDOIR
[COLEOPTERA, CICINDELIDAE]**

PAR

Thierry DEUVE

75, rue de Vaugirard, F-75006 Paris.

SUMMARY

Caledonica viridicollis n. sp., is described from New-Caledonia. This new species is compared to *C. myrmidon* Fauvel and *C. rivalieri* Deuve.

Mots-clés : *Coleoptera*, *Caraboidea*, *Cicindelidae*, *Caledonica* Chaudoir, nouvelle espèce, Nouvelle-Calédonie.

Caledonica viridicollis, n. sp.

Holotype : 1 femelle, seul exemplaire connu, Nouvelle-Calédonie (ex Musaeo Gambey, ex coll. R. Oberthür). In coll. M.N.H.N., Paris.

Longueur 12 mm. Revêtement dorsal vert-cuivreux, les appendices testacés, le labre éburné mais rembruni sur les marges latérales, l'épistome et la face ventrale avec des reflets métallescents.

Tête au vertex peu ridé. Labre aussi long que large, rétréci à l'apex, le bord antérieur trilobé (femelle), les dents latérales atteignant seulement le tiers antérieur.

Pronotum transverse, 1,30 fois plus large que long, les côtés régulièrement arqués. Rebordement marginal visible sur les côtés sous la forme d'un long bourrelet. Disque quasiment lisse.

Elytres comme chez *Caledonica rivalieri*, mais l'espace alutacé intercarinulaire débutant seulement au niveau du bord antérieur de la macule médiane. Les macules par ailleurs plus développées (Fig. 1), la médiane atteignant la carinule interne.

Espèce proche de *Caledonica myrmidon* Fauvel et *C. rivalieri* Deuve, mais plus large, le pronotum proportionnellement plus grand, lisse, le coloris dorsal vert-cuivreux. Rebord latéral du pronotum, le long de la suture notopleurale, visible dorsalement sous la forme d'un bourrelet caractéristique.




Fig. 1. — *Caledonica viridicollis*, n. sp., schéma du dessin élytral.

RÉFÉRENCE

DEUVE (Th.), 1981. — Le genre *Caledonica* Chaudoir. Liste commentée et description de deux espèces nouvelles (Col. Caraboidea, Cicindelidae). — *Annls Soc. ent. Fr.* (N.S.), 17 : 179-190.