

- 2. Taille grande (7 1/3 mill.). Corselet faiblement rétréci vers la base; celui-ci et l'abdomen bronzés, à bords flavescents. domesticus.
- Taille assez petite (5 1/2 mill.). Corselet fortement rétréci vers la base, maculé de flave en dessus et en dessous. Abdomen flave presque en entier scalaris.
- 3. Corselet assez large, transverse, à peine impressionné à la base, étroitement rebordé sur les côtés lateridens.
- Corselet très étroit, à peine transverse, assez profondément impressionné à la base, assez largement déprimé sur les côtés. parvicollis.

1. **L. domesticus** * Montr., *Ann. Fr.*, 1860, 240. — Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 270.

Ile des Pins; Nouméa; Yahoué, 11; Thio; Païta; Koné, 3; Bourail; Kanala. — Art.

Assez commun; se trouve parfois dans les maisons.

2. **L. scalaris** * Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 270.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

3. **L. lateridens** * Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 271.

Yahoué, 11 (S.); Koné (A.); ile des Pins (D.).

4. **L. parvicollis** Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 217.

Mont Mou (D.).

Unique.

Stenolophus Dejean

Amphibia Montrousier

Genre nombreux et cosmopolite.

- Bronzé-verdâtre. Tête ordinaire. Elytres brillantes (♂) ou d'un olivâtre mat (♀), à interstries plans; une tache ponctiforme rougeâtre à l'épaule. sexualis.
- Noir irisé. Tête plus grosse. Elytres à interstries subconvexes, immaculées. grandiceps.

1. **S. sexualis** * Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 270.

Ile des Pins; Nouméa, 6; Kanala. — Lifou (W.).

2. **S. grandiceps** * Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 270. — *pallipes* * Montr., *Ann. Lyon*, 1864, 70 (non Dej.).

Sous les détritus végétaux.

Bourail (L.); Kanala (M.).

Obs. — Cette espèce et la précédente sont très voisines du *margi-natus*, d'Europe; mais les premiers articles de leurs tarses sillonnés au côté externe ne permettent pas de les séparer des *Stenolophus*.

Acupalpus Dejean

1. **A. trapezus** Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 272.

Koné (D.).

Deux exemplaires.

TRIBU PLATYSMATINI

Platycaudus → **Chlœnidius** Chaudoir *Chlœnioidius*

Genre australien, dont deux espèces s'étendent jusqu'en Nouvelle-Calédonie.

Dessus d'un vert irisé. Elytres à stries pointillées Melliei.
Dessus noir, rarement à peine irisé. Elytres à stries lisses. prolixus.

1. **C. Melliei** * Montr., *Ann. Fr.*, 1860, 238. — *Rec. d'Ent.*, 1882, 241. — *herbaceus* * Chaud., *Bull. Mosc.*, 1865, III, 112. — *resplendens* Lap., *Not. Austr. Col.*, 1867, 131.

Sous les pierres, sous la vase desséchée des marais; assez commun.

Baie du Prony; Nouméa; Anse Vata, 2; Yahoué; Bourail; Koné; Kanala; Balade.

Australie.

2. **C. prolixus** Wieg. *Arch.*, 1842, I, 127. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1865, III, 110. — Fvl., *Rec. d'Ent.*, 1882, 241. — Var. *caledonicus* * Tchits., *Rec. russe d'Ent.*, 1901, I, 46.

Ouraï (L.); Bourail (B.).

Australie, Tasmanie.

Obs. — Je n'en ai vu que quatre exemplaires. De Chaudoir, à qui j'en avais communiqué deux, m'a répondu que ce n'étaient rien que