

testacé en entier et son corselet à côtés arrondis, dépourvus de calus latéral.

C'est l'espèce la plus commune; elle paraît habiter toute la colonie, bien qu'elle soit plus répandue dans le nord.

6. *affinis*\* Montr., *Ann. Ent. Fr.*, 1860, 234.—Fauv., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, 1862, VII, 130, pl. 9, fig. 6-7.—*fasciata*\* Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, 313.

De la taille de *Bavayi*; mais tout autre que les précédentes par sa forme plus étroite, allongée, le corselet plus cylindrique, à sillon nul, la disposition et la grandeur des taches éburnées, etc.

Vit dans les plaines, fréquemment sur le *Rhus atra* Forster, une espèce de banian et même sur les palétuviers; rare.

Ile des Pins; Balade (*Deplanche*).

*Obs.* La synonymie de cette espèce est donnée d'après les types de Chaudoir et son *Catalogue* (p. 15).

### 7. *myrmidon*'.

♂ *C. affini* forma et colore subsimilis, sed triplo fere minor, antennis brevioribus, labro dilutiore, antice truncato, parte truncata utrinque haud parum acuto-producta, lateribus extus incisuram minus acuto-productis, capite minus nitido, vertice densius rugosiore, thorace angustiore, minus transverso, scutello antice parum rugosulo, elytris apice parcius subtiliusque punctatis, angulo suturali haud rectis, sed profunde oblique emarginatis, lunula humerali postice attenuata, nec truncata, media costam juxtasuturalem non omnino attingente, intus non attenuata, sed ampliata, apicali minima, rotundata, nec postice arcuata, segmento 7° subtus magis sinuatim inciso, incisura basi multo angustiore, tarsis anticis nigro, nec albo pilosis; ♀ labro apice producto, tridentato, inde ultra medium longius acutiusque dentato. — L., 9 mill.

Ourail (*Lécard*); Kanala (*Bougier*).  
Collection Gamby et la mienne.

*Obs.* C'est la plus petite du genre et sans doute une des plus rares; M. Gamby l'a reçue deux fois seulement et en très-petit nombre des localités indiquées.

### 8. *pulchella*\* Montr., *Ann. Ent. Fr.*, 1860, 234.

Labre largement brun sur toute la longueur des côtés; élytres cylindriques, bleuâtres, lisses au sommet, à tache humérale isolée, subcarrée, doublée en dedans d'une autre tache arrondie, l'intermédiaire très-droite, perpendiculaire au bord externe, l'apicale ovale et non en croissant ouvert intérieurement comme chez *affinis*; carinules rétififormes effacées, la juxtasuturale seule étant à peine indiquée. — L., 12 mill.

Nouvelle-Calédonie; rare (*Montrousier*).  
Collection du Muséum de Paris.

*Obs.* Il existe un type de cette espèce bien distincte dans la collection citée. Elle doit être très-localisée, si, comme il y a lieu de le croire, l'habitat indiqué par le P. Montrousier est exact; car je ne l'ai jamais vue dans aucun envoi.

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Dix espèces de Cicindélides habitent la Nouvelle-Calédonie, réparties dans trois genres très-distincts, *Vata*, *Cicindela* et *Caledonica*. Le premier et le dernier de ces genres paraissent jusqu'ici particuliers à la colonie; seule la *Cicindela interrupta* F. possède une large extension géographique et s'étend jusqu'aux Iles asiatiques (Java, etc.).

Les Cicindélides calédoniennes constituent donc une famille bien isolée en Océanie, malgré les affinités de leur principal groupe (*Caledonica*) avec les *Distypsidera* d'Australie.

### CATALOGUE DES CICINDÉLIDES.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. <i>Vata</i> Thomsoni Perr.            | 6. <i>Caledonica</i> Bavayi Fauv. |
| 2. <i>Cicindela</i> interrupta Fabr.     | 7. » lunigera Chaud.              |
| 3. <i>Caledonica</i> mediolineata Lucas. | 8. » affinis Montr.               |
| 4. » tuberculata Fauv.                   | 9. » myrmidon Fauv.               |
| 5. » Mniszechi Thoms.                    | 10. » pulchella Montr.            |