

Habitat in Brasilia meridionali. D. *Saint-Hilaire*. *Mus. berolin.*, Oberleithn.

analis (Fabricius) 46. C. viridi-aenea; elytris margine cyaneo; labro, ano femoribusque rufis.

Fabr. Syst. El. I. p. 236. n. 24. — Schoenh. Syn. Ins. I. p. 242. n. 25. — Dej. Spec. I. p. 53. n. 19.

— Long. 5½ lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat in Java insula. *Mus. berolin.*, bruxell.

Divisio Vta.

Corpus subdepressum; labrum quinquedentatum, tridentatum et subdentatum.*

lugubris (Dejean) 47. C. nigra, supra obscura, subtus nitida; elytris maculis duabus lineolisque flavescentibus.

Dej. Spec. I. p. 59. n. 23.

Long. 9 lin. — Lat. 3 lin.

Habitat ad Senegal. D. *Prévost-Duval*.

cincta (Olivier) 48. C. supra obscura, subtus viridi-cyanea; elytris vitta laterali punctisque quatuor albis.

Fabr. Syst. El. I. p. 240. n. 40. Ent. S. I. p. 175. n. 27. — Oliv. II. 33. p. 10. n. 6. T. 3. Fig. 33. Dict. Ins. p. 728. n. 7. — Schoenh. Syn. Ins. I. p. 244. n. 42. — Dej. Spec. I. p. 40. n. 24. V. p. 208. n. 24.

Long. 7½ lin. — Lat. 2½ lin.

Habitat ad Senegal. D. *Dumolin*. *Mus. berolin.* Hunter. Variat puncto elytrorum primo albo, capite thoraceque subtus obscuro-viridi-cupreis.

vittata (Fabricius) 49. C. supra cupreo-obscura, subtus viridi-cyanea; elytris vitta laterali intus dentata punctisque disci albis.

Fabr. Syst. El. I. p. 240. n. 41. — Schoenh. Syn. I. p. 244. n. 43. — Dej. Spec. I. p. 41. n. 25.

Long. 6¾ lin. — Lat. 2 lin.

Habitat ad Senegal.

Luxerii (Dejean) 50. C. capite thoraceque obscuro-cupreis; elytris obscure viridi-aeneis, margine laterali intus tridentato punctisque quatuor disci albis.

Dej. Spec. V. p. 221. n. 151.

Long. 4½ lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat ad Senegal superius. D. *Buquet*. *Mus. berolin.*
fuliginosa (Dejean) 51. C. supra cupreo-obscura, subtus viridi-cyanea; elytris margine laterali dentato punctisque disci albis.

Dej. Spec. II. p. 415. n. 129.

Long. 5 lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat in Cochinchina. D. *Querin*.

Vigorsii (Dejean) 52. C. supra viridi-obscura; elytris vitta submarginali obliqua abbreviata, lunula apicali interrupta lineolisque tribus albis.

Dej. Spec. V. p. 223. n. 152.

C. semivittata? Fabr. Syst. El. I. p. 237. n. 25.

Long. 5 lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat in India orientali. D. *Gory*. *Mus. berol.*

semivittata (Fabricius) 53. C. atra; elytris vitta submarginali abbreviata punctisque quinque albis.

Fabr. Syst. El. I. p. 237. n. 25. — Schoenh. Syn. I. p. 242. n. 26.

C. striolata Illig. in Wied. Arch. I. 2. p. 114. n. 10.

C. Vigorsii? Dej. Spec. V. p. 223. n. 152.

Habitat in Sumatra. D. *Daldorff*. — Média.

interrupta (Fabricius) 54. C. supra fusco-aenea; elytrorum puncto baseos, fasciis tribus interruptis lineolaque apicis albidis.

Fabr. Syst. El. I. p. 236. n. 19. Ent. S. I. p. 172. n. 15. Mant. I. p. 186. n. 10. Sp. Ins. I. p. 284. n. 7. S. Ent. p. 225. n. 4. — Oliv. Ent. II. 33. p. 16. n. 14. T. 2. Fig. 15. Dict. Ins. n. 16. — Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1923. n. 32.

C. interstincta Schoenh. Syn. I. p. 241. n. 20. — Dej. Spec. I. p. 42. n. 26. V. p. 209. n. 26.

Long. 7½ lin. — Lat. 2½ lin.

Habitat in Guinea. D. *Mac Leay*. Ad Senegal flumen. D. *Dumolin*. *Mus. berol.* — Foeminae labium superius nigrescenti-album, apice nigrum, valde productum et medio dente fortissimo instructum.

Ménétrièrii (Gistel) 55. C. nigra, obscura; elytris margine postico interrupto albo.

C. interrupta Fabr. Syst. El. I. p. 243. n. 58. — Schoenh. Syn. I. p. 246. n. 62.

Habitat in Java. *Mus. D. Banks*. — Statura parva *C. funestae*.

*) E. G. apud species priores usque ad *C. didyma* m.

In honorem clar. naturae Indagatoris, Dno. *Eduardo Ménetriés*, petropolitani Conservatoris musei etc. nomen accepit.

equestris (Dejean) 56. C. supra viridis; elytris limbo ante marginem intus dentato, striga media tenni flexuosa, lineola ad basin punctisque duobus albis.

Dej. Spec. II. p. 416. n. 130.

Habitat in insula Gallia (ile de France) et in Madagascar. D. Lesson.

marginella (Dejean) 57. C. supra viridis; elytris limbo ante marginem intus dentato, strigaeque media flexuosa albis,

Dej. Spec. II. 417. n. 131.

Long. 4½ lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat in promontorio bonae spei. D. Schüppel. Mus. berol. — Mas foemina minor.

bicolor (Fabricius) 58. C. viridis, nitida; elytris viridi-cyaneis, immaculatis; abdominis margine testaceo.

Fabr. Syst. El. I. p. 235. u. 10. Ent. S. I. p. 170. n. 8. Mant. I. p. 185. n. 4. Sp. Ins. I. p. 283. n. 2. Oliv. II. 33. p. 11. n. 7. T. 2. Fig. 14. Dict. Ins. n. 8. — Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1919. n. 18. — Schoenh. Syn. I. p. 238. n. 10. — Dej. Spec. I. p. 43. n. 27. ♂ ♀ —

Long. 7 lin. — Lat. 2½ lin.

Habitat in India orientali. In Italia D. Gmelin. (Certo) Mus. berolin., Oberleitn.

chinensis (De Géer) 59. C. cyaneo-aureoque variegata; elytris viridibus, maculis duabus cyaneis, fascia sinuata abbreviata punctisque tribus albis.

Fabr. S. Eleuth. I. p. 236. n. 25. Ent. S. I. p. 175. n. 18. — Oliv. Ent. II. 33. p. 9. n. 5. T. 2. Fig. 20. et Tab. 3. Fig. 50. Dict. Ins. n. 6. — De Géer Ins. IV. p. 119. n. 1. T. 17. Fig. 25. — Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1924. n. 42. — Schoenh. Syn. I. p. 242. n. 24. — Dej. Spec. I. p. 44. n. 28. V. a. p. 209. n. 28.

C. japonica Thunb. Nov. Ins. Spec. I. p. 25. Fig. 59. — Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. q. 1923. n. 36.

Long. 9½ lin. — Lat. 3¼ lin.

Habitat in Sina et Japonia. Mus. berol., Westerh., Oberl. — Foeminae labium brunneo-nigrum, productum, dentibus fortioribus; macula albo-flava basali. Palpi viridi-aeni.

Duponti (Dejean) 60. C. cyaneo aureoque variegata; elytris

viridi-obscuris, maculis duabus obscuro-cyaneis, fascia recta abbreviata punctisque tribus albis.

Dej. Spec. II. p. 419. n. 132.

Long. 8 lin. — Lat. 2½ lin.

Habitat in Cochinchina. D. Dupont. Mus. berolin.

aurofasciata 61. C. supra nigro-obscura; elytris lunula humerali apicalique integra, fasciaque media transversa fulvis.

Dej. Spec. V. p. 224. n. 153.

Long. 8½ lin. — Lat. 3 lin.

Habitat in India orientali. D. Guerin.

octonotata (Wiedemann) 62. C. viridi-cyaneo aureoque variegata; elytris maculis quatuor flavis, tertia biloba.

Wiedem. Zool. Mag. I. 5. p. 168. n. 16. — Dej. Spec. I. p. 45. n. 29. — Griffith the animal Kingdom I. p. 264. Pl. 29. Fig. 5.

Long. 10½ lin. — Lat. 8½ lin.

Habitat in Indiae orientalis Bengalia. D. Westermann. Mus. berol., monac. (*C. solonotata* Westerm.) — Inter maximas et pulcherrimas.

haemorrhoidalis (Wiedemann) 63. C. supra aterrima; capite thoraceque metallico-aeneis, labro aureo-viridi; elytris maculis quatuor aurantiacis.

Wiedem. Mag. II. 1. p. 63. n. 97.

C. quadrimaculata Sturm Catalog. p. 55. T. I. n. 1.

Long. 7 lin. — Lat. 1½ lin.

Habitat in India orientali. Mus. berolin., Sturm.

Princeps (Vigors) 64. C. atra; elytris fasciis tribus aureo-flavis; humerali abbreviata subquadrata, media lata subincurva transversa, apicali angusta.

Vigors in Zool. Journ. Vol. I. p. 413. Tab. 15. Fig. 1.

Long. 9½ lin. — Lat. 4 lin.

Habitat in India orientali. Mus. Mac Leay., Vigors. — An huc pertineat?

aurulenta (Weber) 65. C. viridi cyaneo aureoque variegata; elytris maculis quatuor albidis; tertia lunata.

Fabr. Syst. El. I. p. 239. n. 38. — Web. Obs. Ent. p. 45. n. 1. — Schoenh. Syn. I. p. 244. n. 40. — Dej. Spec. I. p. 46. n. 30.

C. 6-punct. β. aurulenta Web. Nom. ent. p. 25.

Long. 7, 8 lin. — Lat. 2½, 2¾ lin.