

Elytres oblong-ovales, de la même forme que chez *vertagoides*, avec les épaules très arrondis, un peu élargis après le milieu et arrondis au sommet, avec une faible sinuation devant l'apex. Les stries profondes, les interstries convexes, densément et assez fortement ponctués (4-5 lignes par largeur), et faiblement pubescents. La saillie prosternale rebordée, les propisternes éparsement ponctués, les metepisternes avec un sillon externe et un peu plus longs que larges. Abdomen lisse. Deux femelles. Long. 13 mm, large 5 mm. Ancienne Afr. or., sans indication précise. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

Par la forme du corps il se rapproche au *Chl. Heyrovskýi* Jedl. de Joko à Cameroun et il diffère de celui-ci par la couleur (celui-ci est noir avec une tache jaune au milieu), par le pronotum (celui-ci est noir avec une tache jaune au milieu), par le pronotum un peu plus étroit, plus densément et moins grossièrement ponctué. Les élytres sont striés et ponctués de même. J'ai placé *Chl. Heyrovskýi* (chez le mâle du type manquant les derniers articles des palpes) provisoirement dans le subg. *Stenodinodes* et *Chl. Kaszabi* appartient au le même groupe.

***Chlaenius conformis* var. *jokoanus* var. n.**

Diffère de la forme typique par la forme de la macule antéapicale, qui est très réduite et se compose de quatre taches situées sur les intervalles 4-7, dont les deux externes sont un peu prolongées vers l'apex.

Cameroun, 2 ex. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

***Chlaenius flaviguttatus* ab. *immaculipennis* ab. n.**

Diffère du type par l'absence de la tache jaune sur l'apex des élytres. Nouvelle Guinée (type) 8 ex, Nord Queensland 1 ex. Type dans ma collection, cotypen au muséum Budapest.

***Chlaenius Székessyi* sp. n.**

Tête d'un vert luisant avec un faible reflet bleuâtre, pronotum vert métallique avec les bords latéraux bleus, au milieu parfois cuivreux. Elytres noirs mats avec le bord extrême violet. Les deux premiers articles des antennes, les palpes et pattes rouges, le rest des antennes presque noirs et parfois les tibias postérieurs rembrunis. Tête finement ponctuée dans la partie postérieure. Pronotum carré, plus au moins aussi large que long, rétréci modérément en avant, pas ou très peu en arrière, avec la plus grande largeur au milieu; le bord antérieur échancré avec les angles antérieurs peu avancés, les angles postérieurs

esque droits, arrondis au bout, la base coupée obliquement vers les angles postérieurs. Les côtés relevés, surtout derrière. La surface ponctuée modérément, la ponctuation plus éparée en avant, très dense devant la base et autour des impressions basales, qui sont assez faibles. Les élytres allongés, peu arrondis aux côtés, finement striés, les intervalles un peu convexes, densément ponctués et pubescents. Les metepisternes aussi larges que longs et peu ponctués. Long 11-13 mm. Cameroun: Joko, 12 ex. Type dans ma collection, 5 cotypes au muséum Budapest.

Probablement voisin au *Chl. amydrus* All., lequel je ne connais pas, mais qui est plus grand, autrement coloré et avec les pattes noirs.

***Chlaenius Horváthi* sp. n.**

D'un noir peu luisant, les bouts des palpes rouges. Labrum droit. Tête finement pointillée, entremêlé par quelques points plus grands. Pronotum carré, un peu plus large que long, plus large que la tête, distinctement échancré en avant avec les angles antérieurs saillants et arrondis, les côtés arrondis et rétrécis assez fortement en avant, presque rectiligne en arrière, la base plus large qu'en avant, aussi large qu'au milieu du pronotum, droite au milieu, mais coupée obliquement vers les angles postérieurs, qui sont obtus et peu arrondis au sommet. Les impressions basales sont linéiformes, courtes, toute la surface du pronotum est couverte d'une ponctuation très serrée, surtout le long de la base. Elytres sont larges, à la base aussi large que la base du pronotum, la plus grande largeur se trouve au milieu, les côtés sont légèrement arrondis. Les stries sont profondes, faiblement ponctuées, les intervalles modérément convexes, finement et densément ponctués et pubescents. L'angle huméral obtus. Saillie prosternale non rebordée, le metepisternum aussi long que large, tout le dessous ponctué. Long. 15 mm, large 6.5 mm. Uganda: Mujenje, 4 femelles. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

Par son faciès il ressemble au *Chl. carbonatus* Chd., mais appartient au groupe du *Chl. piceus* et voisin au *Chl. sculptilis* Bat., qui d'après la description est plus grande (18 mm), et a „thorace elongato versus apicem parum angustato” et „sulcis fundo crenato-punctatis”. Par ces deux caractères il diffère du *Chl. Horváthi*.