

Nanophthalmus m. nouveau genre de la forme des *Cephennium* et bien distinct par le manque des yeux. Massue des antennes grosse, de deux articles seulement.

137. *N. megaloderoides* m., d'un testacé roussâtre, un peu velu. Moitié plus petit, plus court, plus arrondi et plus bombé que le *Cephennium thoracicum*; impressions sur le corselet et les élytres pas visibles. Tauride (Aloupka) sous les feuilles dans les forêts des pins.

3. TRECHIENS.

Nestra m. nouveau genre qui présente un facies des *Stenelophus*, mais plus déprimé, plus lisse, sans stries sur les élytres; abdomen prolongé et dilaté comme chez les *Lebia*. Antennes à articles moniliformes, palpes des *Trechus*, mandibules avancées comme chez les *Stomis*; jambes échancrées sur la face intérieure, garni d'une petite épine vers l'extrémité, tarsi simples dans les deux sexes, crochets sans dentelures.

138. *Nestra ruficollis* m., luisant d'un testacé roussâtre, partie postérieure de la tête et flancs latéraux des élytres noirs. Forme et aspect d'un petit *Badister bipustulatus*. Ind. or.

139. *N. nigricollis* m., un peu plus petit que la *N. ruficollis* et distincte par son corselet noir ou brun foncé; base des élytres comme la suture d'un testacé clair. Ind. or.

140. *Trechus fasciatus* m. testacé, partie postérieure

de la tête et une large bande transversale sur les élytres noires. Corselet transversal; sur chaque élytre quatre stries très imprimées de points enfoués, qui n'atteignent pas l'extrémité; une seule fovéole sur la 4^{ème} strie vers le milieu de l'élytre. Forme du *Tr. minutus*, mais presque moitié plus petit. Ind. or.

141. *Lymnaeum indicum* m., plus applati que le *L. areolatum*, corselet plus large. Couleur testacée. Elytres assez fortement ponctuées, corselet et tête parsemées de points plus épars. Presque le double plus petit que le *L. areolatum*. Ind. or.

Tachys Ziegler.

1. CORPS ALLONGÉ, PARALLÈLE.

441. *Tachys sericea* m., par sa forme et le reflet métallique sur les élytres, elle rappelle les *Stenelophus* et les *Trechus*, mais par ses palpes subuleux et ses antennes très grêles, elle se range parmi les *Tachys*. A peu près de la taille du *Trechus minutus*, d'un testacé roussâtre, milieu de la tête, des élytres et les bords latéraux de ces dernières rembrunies. 4 stries imprimées sur chaque élytre. Ind. or.

142. *T. umbrosa* m., de la forme de *T. nana* mais un peu plus grande, couleur plus rembrunie, surtout à la base et vers l'extrémité des élytres. Pattes et antennes d'un roux testacé. Jambes antérieures dilatées et échancrées vers l'extrémité; 5 stries de points imprimées sur chaque élytre. Ind. or.

143. *T. parallela* m., presque de la taille et de la