

transversal sans sillon ni fossettes bien marqués, un peu plus étroit que les élytres. *Elytres* planes, parallèles, arrondies au bout, striées. *Tarses* simples. *Jambes antérieures* échancrées, épineuses. *Antennes* moins longues que la tête et le prothorax.

Ce genre est créé pour un petit insecte que l'on prendrait pour un *Ophonus* ou plutôt pour un *Poyonus*, si ce n'étaient les palpes qui obligent à le mettre à côté des *Rembidiomus*.

#### **Amphibia Pallipes.**

Long. 0<sup>m</sup>,0055.

Noir brillant. *Pattes* testacées. *Antennes* brunes. Un sillon à peine marqué sur le prothorax. *Trochanters* postérieurs très-développés.

Pris à Kanala sous les détritux de végétaux. Rare.

NOTA. Cet insecte ne m'a point été envoyé, je ne puis que transcrire ce qu'en a écrit M. Montrousier.

#### **Bradiceilus Biguttatus.**

*Æneo-niger, nitidus, antennarum articulis tribus primis, pedibusque ferrugineo-testaceis. Capite triangulare. Prothorace transverso, sub-cordato, angulis posticis acutis carinatisque. Elytris oblongis, singulatim quinque striatis (striis quatuor primis discoidalibus, antice posticeque gradatim evanescentibus, quinta laterale, profunde impressâ, fractâ) maculâque rotundatâ ferrugineo-testaceâ ad apicem ornatis.*

Long. 0<sup>m</sup>,003; larg. 0<sup>m</sup>,002.

*Tachys? Biguttatus, Montrousier in litteris.*

*Corps* d'un noir bronzé brillant. *Tête* triangulaire, marquée d'un petit sillon de chaque côté entre les antennes. *Labre* transversal coupé carrément en avant. *Palpes* d'un testacé ferrugineux. *Yeux* gros noirs, modérément saillants. *Antennes* plus longues que la tête et le

#### *Bradiceilus Biguttatus.*

prothorax réunis, ayant leurs trois premiers articles, d'un testacé ferrugineux, plus ou moins tachés de brun en dessus; les autres bruns, revêtus d'une pubescence qui les fait paraître obscurs. *Prothorax* transversal, un peu cordiforme, échancré en arc à son bord antérieur et au milieu de sa base, arrondi et rebordé sur ses côtés dans les quatre premiers cinquièmes de sa grandeur, sinué ensuite vers la base, ses angles antérieurs abaissés et aigus, les postérieurs relevés, très-aigus et chargés d'une très-courte ligne élevée ou carène; modérément convexe et lisse en dessus, marqué sur sa ligne médiane d'une strie longitudinale, et vers sa base d'un sillon ne formant qu'une fine bordure près des angles postérieurs. *Ecusson* court en triangle presque curviligne. *Elytres* oblongues, plus larges à leur base que le prothorax à la sienne, trois fois aussi longues que lui, arrondies ensemble à l'extrémité et faiblement sur les côtés; assez convexes en dessus avec les épaules arrondies et paraissant un peu avancées; creusées chacune de 5 stries, la 1<sup>re</sup> vers la suture partant de la base où elle est moins enfoncée et s'arrêtant aux cinq sixièmes de la longueur, la 2<sup>e</sup> touchant à peine la base et s'arrêtant avant l'extrémité de la 1<sup>re</sup>, la 3<sup>e</sup> plus courte que la 2<sup>e</sup> soit en avant soit en arrière, la 4<sup>e</sup> encore plus courte que la 3<sup>e</sup>, moins enfoncée que celle-ci et n'occupant que la moitié médiane de la longueur de l'élytre; enfin la 5<sup>e</sup> largement séparée des 4 premières, et plus profondément gravée, est placée près du bord externe de l'élytre, elle commence dessous l'épaule, se prolonge jusqu'aux 2/3 de la longueur où elle se recourbe et descend davantage vers le bord externe qu'elle cotoie de plus près jusqu'à l'angle sutural, présentant ainsi une ligne brisée; ornées chacune près de leur extrémité d'une tache ronde d'un testacé ferrugineux. *Dessous du corps* d'un noir moins bronzé que le dessus. *Pattes* d'un testacé ferrugineux.

Je n'ai reçu qu'un exemplaire de cet insecte que M. Montrousier dit être commun à Kanala, sous les détritux de végétaux dans les endroits humides.