

Trechus Litura,

Nigro-piceus, nitidus, sutura rufa, ore, antennis pedibusque rufis; elytris 6-punctatis.

Long. 0^m,0023; larg. 0^m,0015.

Trechus Litura, Montrousier in litteris.

D'un noir de poix, brillant et lisse, avec la suture des élytres d'un rouge plus ou moins vif, les parties de la bouche, les antennes et les pattes flaves. *Tête* lisse, creusée d'un petit sillon de chaque côté entre les antennes. *Yeux* assez gros, saillants. *Prothorax* transversal, un peu plus large que la tête, légèrement échancré en arc en avant, avec ses angles antérieurs un peu aigus et abaissés; arrondi et rebordé sur ses côtés, sinuusement rétréci près de sa base, celle-ci un peu obliquement coupée vers les angles postérieurs qui sont obtus, puis très-légèrement échancrée dans son milieu; faiblement convexe en dessus, marqué sur sa ligne médiane d'un mince sillon partant de la base et n'atteignant pas le bord antérieur, et creusé de chaque côté près des angles postérieurs d'une petite fossette dans laquelle on aperçoit quelques fines stries longitudinales. *Ecusson* très-petit, triangulaire, rougeâtre. *Elytres* près de trois fois plus longues que le prothorax, aussi larges à leur base que celui-ci dans sa plus grande largeur, s'élargissant ensuite jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de leur longueur et de là se rétrécissant en ligne courbe jusqu'à leur extrémité; assez convexes en dessus, avec les épaules arrondies et un peu avancées, lisses, brillantes avec la suture d'un rouge plus ou moins vif; marquées chacune plus près de la suture que du bord externe de 3 points enfoncés, le 1^{er} au quart, le 2^e à la moitié, et le 3^e aux trois quarts de la longueur. *Dessous du corps* d'une couleur plus pâle que le dessus, toutes les pattes flaves.

Trouvé à Kanala par M. Montrousier, sous des détritres de vé-

Bembidium Kanalense.

Piceum, nitidum; ore, antennarum articulis duobus primis pedibusque flavis; prothorace transverso, sub-cordato, lateribus leviter marginato, supra modice convexo, ad basin transversim impresso, utrinque leviter foveolato, angulis posticis rectis, carinatis. Elytris oblongo ovatis, singularim ad suturam bi sulcatim-striatis punctisque duobus impressis, longe antè apicem maculâ rotundatâ rubro-aurantiacâ ornatis.

Long. 0^m,0025; larg. 0^m,001.

Corps en dessus lisse, d'un brun foncé brillant, avec les élytres ornées chacune aux deux tiers de leur longueur d'une tache arrondie d'un orangé rougeâtre. *Tête* creusée entre les yeux de deux sillons dirigés obliquement l'un vers l'autre et se réunissant presque au dessus du labre. *Labre* et *palpes* testacés, *mandibules* obscures à leur extrémité. *Antennes* obscures, leurs deux premiers articles testacés. *Yeux* arrondis, saillants, noirs. *Prothorax* moins long que large, subcordiforme, plus large que la tête, coupé carrément en avant et en arrière, arrondi sur les côtés, qui sont finement rebordés, rétréci près de sa base, avec ses angles postérieurs droits et surmontés chacun d'une petite carène; modérément convexe en dessus, le sillon antérieur entièrement effacé, la ligne longitudinale médiane très-courte et à peine marquée, le sillon transversal à la base un peu arqué, assez large, ponctué, bien marqué et plus profondément en forme de fossette vers chacun des angles postérieurs. *Ecusson* petit, triangulaire. *Elytres* presque de moitié plus larges que le prothorax, 4 fois aussi longues que lui, en ovale allongé, coupées presque carrément à leur base, arrondies ensemble à leur extrémité; médiocrement convexes en dessus, les épaules arrondies; creusées chacune près de la suture de 2 stries sulciformes rapprochées l'une de l'autre, allant de la base jusqu'à l'extrémité où elles

sont moins marquées; on aperçoit contre la 2^e strie et sur son bord extérieur 2 points enfoncés l'un au quart et l'autre à la moitié de la longueur de l'élytre, et près du bord externe de celle-ci un sillon longitudinal présentant quelques points enfoncés. *Dessous du corps* brun, avec les épipleures, les côtés du prothorax et de la poitrine d'un orangé rougeâtre. *Pattes* flaves.

Cette petite espèce de la taille du *B. Guttula*, mais plus convexe, a été prise à Kanala, par le R. P. Montrouzier qui me l'a envoyée avec ces mots : *A décrire*. Il l'a regardait donc, et avec raison, distincte de son *B. Artense* (1); bien que la description superficielle qu'il a donnée de cette dernière espèce puisse lui être appliquée, si l'on ne faisait attention à ces mots : *élytres striées*, qu'il a employés pour l'*Artense* et qui ne sauraient convenir à notre *Kanalense*.

HYDROCANTHARES.

Hyphidrus Austro-Caledonicus.

Ovatus, crassus, supra convexiusculus, rubro-brunneus, capite laeve, ferrugineo-rufo. Prothorace brunneo, lateribus rufis, supra ruguloso. Elytris coriaceis, lineis punctatis, plus minusve distinctis, subtiliter impressis. Subtus corpore pedibusque rufis.

Long. 0^m,0035; larg. 0^m,002.

Ovale, épais, assez convexe. *Tête* d'un roux ferrugineux, lisse, brillante, marquée de chaque côté près du bord antérieur d'une petite fossette longitudinale et oblique, se dirigeant de dehors en dedans. *Yeux* glauques. *Antennes* ferrugineuses. *Prothorax* d'un

(1) *Annales de la Société Entomologique de France*, 3^e série, tome VIII, 1860, page 241.

Hyphidrus Illigeri.

roux ferrugineux sur ses côtés et le long de sa base, brun sur le reste de sa surface, largement et peu profondément échancré en avant où il est plus étroit qu'en arrière, sa base sinuée au devant des épaules, puis descendant obliquement de chaque côté vers son milieu qui est prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux très-faiblement arrondis et rebordés avec les angles antérieurs saillants et aigus; assez convexe en dessus, un peu rugueux et marqué à chacun de ses bords antérieur et postérieur d'une légère ligne transversale plus ou moins distincte formée de petits points enfoncés. *Elytres* d'un brun rougeâtre, assez convexes, ovalaires, élargies en s'arrondissant sur les côtés dans la première moitié de leur longueur, rétrécies ensuite et terminées en pointe à leur extrémité; aussi larges en avant que la base du prothorax et formant à leur point de réunion avec lui un angle rentrant peu sensible; leur surface coriacée et marquée plus ou moins distinctement de quelques faibles lignes longitudinales formées par de petits points enfoncés, plus visibles près de la base et de la suture que sur le reste de la surface. *Dessous du corps et pattes* ferrugineux.

Cette espèce a été prise dans la Nouvelle-Calédonie par M. Montrouzier, sans qu'il ait pu se rappeler la localité.

Hyphidrus Illigeri.

Ovatus, crassus, supra convexiusculus, dense irregulariterque punctatus, rufo-testaceus. Prothorace ad marginum anteriorem vittâ transversali nigra (interdum deficiente) et ad marginem posteriorem maculâ geminâ nigra, notato; lateribus obliquis, tenue reflexis. Elytris medio longitudinaliter sub-costatis; singularim vittâ longitudinali laciniato-sinuata valde irregulari, nigro-piceâ ornatis; suturâ etiam nigro-piceâ.

Long. 0^m,005; larg. 0^m,003.

Hyphidrus Illigeri, Montrouzier in litteris.

Ovale, court, épais, modérément convexe en dessus. *Tête* testa-