

COLÉOPTÈRES.

CICINDELETES.

Cicindela Thomsonii.

Capite thoraceque fusco-viridibus, elytris viride-nigris; mandibulis, abdomine femoribusque nigris; palpis, antennis (articulis quatuor primis exceptis, his nigro-fuscis), tibiis tarsisque flavescens. Elytris asperatis, lineis duabus punctorum singulatim impressis.

Long. 0^m,011; larg. 0^m,005.

Cicindela Thomsonii, Montrouzier in litteris.

Tête d'un vert foncé luisant; en carré long, renflée derrière les yeux, ridée longitudinalement contre le bord interne de ceux-ci et un peu caréniformement relevée sur sa partie médiane entre la base des antennes. *Epistome et labre* noirs, celui-ci beaucoup plus large que long, coupé presque carrément en avant où il est marqué de six points assez gros, émettant chacun un poil brunâtre et présentant dans son milieu une petite dent aiguë. *Mandibules* grandes et noires. *Palpes* flaves, l'extrémité de leurs articles plus foncée. *Yeux* médiocres, arrondis, saillants, brunâtres. *Antennes* dépassant en longueur le milieu du corps, leurs quatre premiers articles d'un brun noir, glabres et luisants, les autres jaunâtres, densément couverts d'une pubescence de même couleur. *Prothorax* vert foncé, luisant en dessus, vert bleuâtre en dessous; presque cordiforme, coupé droit à ses bords antérieur et postérieur, plus étroit en arrière qu'en avant, arrondi sur les côtés dans les 2 premiers tiers de sa longueur, convexe en dessus avec les sillons antérieur et postérieur et celui du milieu bien marqués; paraissant lisse à la vue simple, mais à la loupe très-finement ridé transversalement, principalement sur son disque. *Ecus-*

son noir, petit, triangulaire, légèrement enfoncé dans son milieu. *Elytres* d'un noir verdâtre, quelquefois bleuâtre; semi-ovale; 3 fois aussi longues que le prothorax, 2 fois aussi larges à leur base que celui-ci dans sa plus grande largeur; coupées carrément en avant, avec l'angle huméral arrondi et bien marqué, curvilinéairement rétrécies dans le dernier quart de leur longueur, subarrondies chacune à leur extrémité et présentant ensemble, à celle-ci, un angle rentrant sur la suture; modérément convexes en dessus où elles sont couvertes de petites aspérités, qui, après le premier tiers de la longueur, diminuent graduellement jusqu'à l'extrémité; marquées chacune, dans le premier cinquième de sa longueur, de deux impressions longitudinales, l'une en dedans de l'angle huméral, et l'autre au milieu de la largeur, et creusées de points assez fortement imprimés, formant deux rangées longitudinales, un peu irrégulières et paraissant faire suite aux deux impressions sus mentionnées; la rangée de points du côté de la suture se prolongeant seule jusqu'à l'extrémité de l'élytre. *Dessous du corps* d'un vert foncé bleuâtre. *Abdomen* et *Cuisses* noirs, celles-ci munies, principalement en dessous, de petits poils blancs. *Tibias* et *Tarses* flaves, également revêtus de poils blancs. *Extrémité des Tibias* et de chacun des articles des *Tarses*, brunâtre. Les *Tarses* antérieurs des mâles sont peu dilatés et densément couverts en dessous de poils courts et jaunâtres.

Cette espèce se rapproche un peu de *C. politula*, Sallé, du Texas; elle a été prise à Jengen par M. Montrouzier, qui l'a dédiée à M. James Thomson, bien connu par ses divers travaux entomologiques.

CARABIQUES.

Calosoma Oceanicum.

(Pl. 1, fig. 1.)

Supra fusco-æneus subviridi tinctus, subtus æneo-cupreus. Capite thoraceque viridi cupreoque variegatis; mandibulis, palpis, antennis, tibiis,
Annales de la Société Linnéenne.

tarsisque nigris, femoribus aeneo-viridibus. Capite inter antennis bisulcato. Prothorace transverso, lateribus rotundato, marginato, ad angulos posticos fossulato. Elytris rubro cupreo cinctis, crenato-striatis, punctisque impressis triplici serie.

Long. 0^m,029 à 0^m,030; larg. aux élytres 0^m,014 à 0^m,015.

Calosoma Oceanicum, Montrousier in litteris.

D'un bronzé obscur en dessus, avec un léger reflet verdâtre. *Tête* plus étroite en avant qu'en arrière des yeux, d'une teinte cuivreuse entre ceux-ci, verte en avant et bronzée en arrière, creusée de deux enfoncements longitudinaux entre les antennes, où elle est assez fortement ponctuée et couverte de rides transversales irrégulières, se confondant avec les points, ceux-ci et les rides s'affaiblissant beaucoup derrière les yeux. *Labre* noir, frangé de poils roux clairs. *Palpes* noirs. *Yeux* saillants, brunâtres. *Antennes* plus courtes que la moitié du corps, leurs quatre premiers articles noirs luisants, les autres ternes et un peu pubescents. *Prothorax* transversal, bronzé, teinté de cuivreux et de vert; du double plus large dans son milieu que la tête; deux fois plus large que long, arrondi sur les côtés, ceux-ci rebordés et un peu relevés; coupé presque droit en avant, les angles antérieurs abaissés et arrondis; légèrement bissinué à sa base, le milieu de celle-ci faiblement prolongé en arrière; ses angles postérieurs abaissés et aigus; frangé de jaune, soit en avant, soit en arrière; peu convexe en dessus; marqué près du bord antérieur d'une impression transversale arquée et sur la ligne médiane d'une strie n'atteignant ni le bord postérieur ni le bord antérieur; creusé près de chacun des angles postérieurs d'une large fossette subarrondie; plus densément ponctué que la tête, et couvert de rides transversales se confondant avec la ponctuation et plus marquées dans son milieu que sur les côtés. *Ecusson* d'un bronzé cuivreux, plus large que long, subtriangulaire, son angle postérieur arrondi; creusé dans son milieu d'une strie longitudinale. *Elytres* d'un bronzé obscur avec un léger reflet

verdâtre et une bordure d'un cuivreux rouge, partant d'un peu au dessous de l'épaule et se continuant jusqu'à l'angle sutural; du double plus larges que le prothorax, 4 fois aussi longues que lui, en carré allongé, arrondies aux épaules, rétrécies obliquement vers leur extrémité où elles se terminent ensemble en un angle obtus; médiocrement convexes en dessus; rayées chacune de quinze stries profondes, et du commencement d'une seizième près de l'écusson. Ces stries, creusées de points qui les font paraître crénelées, ont leurs intervalles relevés et transversalement ridés; on voit sur chacun des 4°, 8° et 12° une rangée de points enfoncés très-distants les uns des autres. *Dessous du corps* d'un bronzé cuivreux brillant avec une teinte verte sur le prosternum et sur le bord antéro-latéral de chacun des anneaux de l'abdomen, ceux-ci creusés, en outre, de chaque côté, d'une petite fossette de même couleur. *Cuisses* verdâtres. *Tibias* et *Tarses* noirs. *Tibias intermédiaires* très-faiblement arqués dans la femelle, seul individu examiné.

Cette espèce se rapproche du *C. Curtisii*, dont elle diffère par son prothorax à peine rétréci près des angles postérieurs, par ses élytres moins convexes, non arrondies à l'extrémité où elles se terminent, comme celles du *C. scrutator*, par sa couleur et par sa bordure cuivreuse.

Ce rare insecte a été trouvé à Kanala par M. Montrousier, sur un pied d'ananas. Cette plante ayant été introduite dans la nouvelle Calédonie, l'insecte y aurait-il été en même temps apporté?

Dromidea (forme de dromie), *novum genus.*

Corps allongé, déprimé. *Tête*, non compris le labre, aussi longue en avant des yeux qu'en arrière de ceux-ci, rétrécie ensuite en forme de col. *Epistome* déclivé en avant, moitié aussi long que large, séparé du labre par une suture bien distincte. *Labre* transversal, un peu plus large en avant qu'à sa base, son bord antérieur coupé droit. *Mandibules* robustes, recourbées presque carrément et aiguës à leur