

A. SCHATZMAYR et C. KOCH (*l. c.*, p. 7 et 16) font connaître que le *T. fumigatus* Motsch. est une deuxième espèce qui doit rentrer dans ce nouveau sous genre, et que c'est à celle-ci qu'il faut rapporter le *T. socius* Schaum comme aberration. D'après leur travail, le tableau analytique de ces deux espèces serait le suivant ; je n'y ajoute que les paragraphes C, D et E, relatifs à l'*haemorrhoidalis*.

1. Sillons frontaux plus courts, prolongés en arrière jusqu'au niveau de la moitié des yeux. Élytres noirs, d'un brun-rouge en arrière. — Type : Dalmatie. Bassin de la Méditerranée, Canaries, Cap Vert. Espèce commune dans l'Afrique septentrionale sous sa forme *corsicus*.

haemorrhoidalis Dej.

A. — Élytres entièrement noirs ou noirâtres. a. *unicolor* Rag.

B. — Élytres teintés de rougeâtre en arrière et près des épaules ; ces teintes claires généralement vagues, rarement nettes, jamais sous forme de taches bien limitées. a. *corsicus* Gaut.

C. — La teinte rougeâtre envahit les élytres et ceux-ci ne sont foncés que sur la suture, sur le milieu des côtés et au sommet. Tête et pronotum noirs ou un peu bruns-rouges. — Biskra (*leg.* Dr A. CHOBAUT) six exemplaires mélangés avec l'ab. *corsicus*. a. *Chobauti* ab. nov.

D. — Tête, pronotum et élytres entièrement rougeâtres, ces derniers à peine obscurs sur la suture et sur le milieu des côtés. Toulon (*leg.* F. ANCEY) trois exemplaires mélangés avec l'ab. *corsicus* et ne paraissant pas immatures. a. *Anceyi* ab. nov.

E. BEDEL (*Cat. rais.*, p. 75, en note) écrit : « A en juger par les termes de sa description, le *T. abyssinicus* Chd., qui provenait vraisemblablement des récoltes de M. RAFFRAY sur le littoral de la mer Rouge, ne doit pas différer du *T. haemorrhoidalis* à élytres unicolores ». On peut penser maintenant que, si l'espèce de CHAUDOIR n'est pas particulière, elle doit se rapporter au *fumigatus* Motsch.

1. Sillons frontaux prolongés en arrière, au moins jusqu'au niveau des bords postérieurs des yeux. — Asie orientale : Chine, Célèbes, Inde, Ceylan et Égypte. **fumigatus** Motsch.

A. — Élytres colorés comme ceux de l'*haemorrhoidalis* ab. *corsicus*. — Type : Haute-Égypte. a. *socius* Schaum.

B. — Individus d'un brun clair. — Type : Ceylan. a. *pallidus* Dupuis.

C. — Microsculpture du pronotum composée de lignes transversales et non d'une réticulation isodiamétrique. — Types : Ile Célèbes. s. *geminatus* Schaum.